Stélka

- nerozlišené tělo rostlin
- 5 (až 9) vývojových typů

Obrázek 1: bičíkatá pláštěnka

Bičíkatá (monadoidní)

- 1 buněčné, 1 jaderné
- Kapkovitý tvar
- 1 nebo více bičíků
- Někdy buněčná stěna

Př. krásnoočka, zelenivky

Obrázek 2: kokální zrněnka a zelenivka

Kokální (buněčná)

- 1 buněčné, 1 jaderné
- Buněčná stěna

Př. rozsivky, zelenivky (řasa zelenivka – 1 kalíškovitý chloroplast)


Obrázek 3: vláknitá Trentepohlia

Vláknitá (trichální)

- Mnohobuněčné, 1 jaderné
- Nevětvené nebo jednoduše větvené

Př. kadeřnatka, Trentepohlia (zelená řasa)

Obrázek 4: trubicovitý žabí vlas

Trubicovitá (sifonokladální)

- Mnohobuněčné, mnohojaderné
- Vláknitá nebo vakovitá
- Větvení

Př. žabí vlas (zelená řasa)


Obrázek 5: pletivná chaluha bublinatá

Pletivná

- Mnohobuněčné
- Velké (15 – 50cm)
- Napodobuje rozlišené tělo (Příchytná vlákna, lodyžka, lístky)

Př. chaluhy, ruduchy

KINCL, Lubomír; KINCL, Miloslav; JAKRLOVÁ, Jana. Biologie rostlin: pro gymnázia . 3. přepracované vydání. Pardubice: Fortuna, 2000. 256 s. ISBN 80-7168-736-7.

© Úpravy může provádět pouze tým serveru *www.nasprtej.cz.*